



【精神科薬剤と抗HIV薬の相互作用一覧】

併用薬				抗HIV薬				エブジ 合錠 コム配	ツル バダ 錠 配合	ストック リン	エジュ ラント	ノー ビア	カレ トラ	レイ アタ ツツ	ブリ ジス スタ ナ イフ	シー トリ ルセ ン	アイ セン トレ	スタ リビ ルド	テビ ケイ		
				代謝酵 素	誘導	阻害															
				一般名	商品名	代謝酵素	誘導	阻害													
									3A4、2B6	3A	3A(4)(親 和性強 い)、2D6	3A(4) (親和性 強い)	一酸化・ 二酸化反 応、3A4	3A4	3A4、P- gp	UGT1A1	3A、(UG T1A 1/3)、主 に3A、2 D6(一 部)	主に UGT1A1 、3A4(わ ずか)			
									3A4、2B6		2B6、2C8、 2C9、1A2、 2C19、3A4						2C9(弱 い誘導)				
									2C9、 2C19、 3A4		3A4、2D6	3A4、 3A5、3A7	3A4、 UGT1A 1、2C8、 1A2、2C9	3A4				3A、2D6、 P-gp、 BORP、 OATP1B1、 OATP1B3、 1A(わず か)	OCT2、 MATE1		
バルプロ酸ナトリウ ム	デパケン	-									注b	注b	○	○	○	○	○	○	○		
パロキセチン塩酸 塩水和物	パキシル	2D6		2D6							●B	○	○	注b	○	○	注B	○			
ハロペリドール	セレネース リントン	2D6、3A4									●b	○	●B	●B	●B	●B	●A	○	●B	○	
ハロペリドールデカ ン酸エステル	ネオペリドール ハロマンズ	2D6、3A4									●b	○	●B	●B	●B	●B	○	○	●B	○	
ヒドロキシジン	アタラックス	3A4/3A5、アル コール脱水素 酵素									●B	○	●B	●B	●B	○	○	○	●B	○	
フェノバルビタール	フェノバル	-	3A								注a	禁a	●a	禁a	●a	注a	注a	○	注a	注a	
フルニトラゼパム	ロヒプノール	-									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
フルフェナジン	フルデカシ	2D6									○	○	○	○	○	○	○	○	●B	○	
フルボキサミンマ レイン酸塩	デプロメール	2D6									1A2、2C19 (強い)、 2C9、2D6、 3A4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
プロクロルペラジン	ノバミン	-									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
プロチゾラム	レンドルミ	3A4									○	○	●b	○	○	○	○	○	○	○	
プロナンセリン	ロナセン	3A4									○	○	●b	○	○	○	○	○	○	○	
プロペリシアジン	ニューレブチル	-									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
プロマゼパム	レキシタン	-									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ペロスピロン塩酸 塩水和物	ルーラン	3A4(最も大き い)、1A1、 2C8、2D6									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ベントバルビタール カルシウム	ラボナ	-									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
放水クロラール	エスクレ	ADH									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ミダゾラム	ミダゾラム	3A4									○	○	禁B	○	○	○	○	○	○	○	
ミルタザピン	リフレックス	1A2、2D6、3A4									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ミルナシプラン塩 酸塩	トレドミン	3A4									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ラメルテオン	ロゼレム	主に1A2で代 謝、2C、3A4も わずかに関与									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
リスペリドン	リスパダール	2D6、一部3A4									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
リルマザホン塩酸 塩水和物	リスミー	3A4									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
レセルピン	アボブロン	-									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
レボメプロマジン	ヒルナミン	2D6									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ロビニロール	レキップ	1A2									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ロフラゼブ酸エチ ル	メイラックス	3A4									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ロラゼパム	ワイパックス	-									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ロルメタゼパム	エバミール	-									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

※表中の青文字表記の箇所は「カレトラを1日1回投与の場合のみ禁忌」を示しています。